

WALKA Z ASF

Bioasekuracja – o czym należy pamiętać?

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 kwietnia 2024 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń.

- 1) Izoluj świnię w sposób wykluczający kontakt z innymi zwierzętami. Zabezpiecz drzwi i okna budynków inwentarskich przed dostępem owadów, gryzoni i innych zwierząt.
- 2) Zabezpiecz wjazd do gospodarstwa i wejścia do budynków, w których utrzymywane są świnię poprzez urządzenia dezynfekcyjne (np. maty). Zabezpieczenie wjazdu obowiązkowe w strefie I (niebieskiej), II (różowej) i III (czerwonej)
- 3) Karm świnię paszą zabezpieczoną przed dostępem innych zwierząt
- 4) Stosuj minimum 30-dniową kwarantannę lub właściwą obróbkę termiczną/chemiczną dla roślinnych surowców paszowych pochodzących ze stref występowania wirusa w środowisku (obszary objęte ograniczeniami II i III)
- 5) Stosuj minimum 90-dniową kwarantannę dla materiałów wykorzystywanych jako ściółka, pochodzących z obszaru objętego ograniczeniami II i III.
- 6) Zmieniaj odzież roboczą i obuwie ochronne przy każdym wejściu do pomieszczeń, w których utrzymywane są świnię.
- 7) Przed wejściem do pomieszczeń inwentarskich myj i odkażaj ręce i obuwie.
- 8) Unikaj udziału w polowaniach i odłowach zwierząt lub czynnościach wymagających osobistego kontaktu ze środowiskiem potencjalnie zanieczyszczonym wirusem ASF. Jeśli brałeś w nich udział przestrzegaj 48-godzinnej kwarantanny, bez kontaktu z świniami.
- 9) Przestrzegaj zakazu wnoszenia na teren gospodarstwa zwłok dzików, tusz dzików, ich części, trofeów, sprzętu i materiałów, które mogły zostać skażone wirusem ASF.
- 10) Unikaj wpuszczania na teren gospodarstwa pojazdów, które mogą przenosić wirusa ASF (np. pojazdów zakładów utylizacyjnych).
- 11) Wyznacz miejsca w gospodarstwie do wjazdu, parkowania oraz oczyszczania i dezynfekcji pojazdów wjeżdżających i opuszczających teren gospodarstwa.
- 12) Stosuj ogrodzenia stanowiące barierę oddzielającą gospodarstwo od zwierząt wolnożyjących. Ma to duże znaczenie przy zapobieganiu przenoszenia wirusa ze środowiska do gospodarstwa (obowiązkowe w strefie II – różowej – w ciągu pół roku od wejścia w strefę).

Dodatkowo:

- Posiadacz świń ma obowiązek informowania urzędowego lekarza weterynarii o każdym przypadku padnięcia świni w gospodarstwie położonym na obszarach objętych ograniczeniami I, II, III.
- **Przed przemieszczeniem świń z strefy I (niebieskiej)** urzędowy lekarz weterynarii musi przeprowadzić badanie kliniczne i wystawić świadectwo zdrowia w ciągu 24 godz. przed wysyłką zwierząt.
- **W strefie II (różowej) przed przemieszczeniem:**
 - świnię przed przemieszczeniem powinny przebywać w gospodarstwie min. 30 dni, a jeśli są młodsze niż 30 dni to od urodzenia;
 - urzędowy lekarz weterynarii musi przeprowadzić badanie kliniczne i wystawić świadectwo zdrowia w ciągu 24 godz. przez wysyłką zwierząt (a w przypadku podejrzenia pobiera próbki do badań w kierunku afrykańskiego pomoru świń)
 - świnię przemieszcza się bezpośrednio do gospodarstwa, rzeźni lub przedsiębiorstwa kontrolowanego przez podmiot gospodarczy po uzyskaniu pozwolenia powiatowego lekarza weterynarii właściwego ze względu na miejsce pochodzenia świń;
 - świnię również można przemieścić po uprzednim ich zgromadzeniu w miejscu przeznaczonym do prowadzenia działalności nadzorowanej w zakresie skupu świń lub na targu położonych na obszarach objętych ograniczeniami II:
 - po uzyskaniu pozwolenia powiatowego lekarza weterynarii,
 - jeżeli w takich miejscach nie znajdują się jednocześnie zwierzęta inne niż świnię.
- **Ubój świń w gospodarstwie położonym na obszarach objętych ograniczeniami I, II, III w celu produkcji mięsa na użytek własny dopuszczalny jest pod warunkiem, że:**
 - świnię te były utrzymywane w tym gospodarstwie co najmniej przez 30 dni przed ubojem;
 - świnię te zostaną poddane badaniu przedubojowemu, a mięso pozyskane w ten sposób – badaniu poubojowemu.